

Remoción del parche

- Para quitar el parche, levante una esquina de este y tire suavemente de ella.
- Doble el parche uniendo la superficie adhesiva y tírelo a la basura.
- Se recomienda que enjuague sus manos con agua después de manipular el parche.

¿Qué cosas se pueden hacer y cuáles no se pueden hacer?

- **Ducha y baño de tina:** los pacientes que usen el parche pueden bañarse, ducharse o nadar. Se recomienda que la temperatura del agua no supere los 38 °C.
- **Deportes:** se puede realizar cualquier deporte que no genere sudoración profusa, ya que esto puede llevar a que se despegue el parche.
- **Calor (sauna y solariums):** el parche no debe exponerse a temperaturas extremas (por ej. Sauna o radiación infrarroja).



Unidad de Alivio del Dolor
y Cuidados Paliativos



INSTITUTO NACIONAL
DEL TÓRAX

José Manuel Infante 717,
Providencia.

Folleto de información al paciente

BUPRENORFINA
TRANSDÉRMICA



INSTITUTO NACIONAL DEL
TORAX
ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO PÚBLICO

El parche transdérmico de buprenorfina es un analgésico opioide potente que se administra a través de la piel, desde donde pasa a la circulación sanguínea para ser transportado al sistema nervioso, donde actúa.

¿Cómo se aplica el parche?

- Elija una zona por encima de la cintura, preferentemente en la parte alta de la espalda o bajo la clavícula.
- No se deben afeitar las zonas con vello. En caso necesario, se recortará el pelo con tijeras para garantizar una mejor adhesión del parche.
- La zona debe estar limpia y seca. Lávela con agua corriente, sin jabón, y séquela cuidadosamente.
- Cada parte está envasada individualmente en un sobre que sólo debe abrirse en el momento de la aplicación.
- El adhesivo del parche va protegido por una fina hoja. Quite la tira más estrecha de esta hoja.
- Sitúe el parche sobre la zona elegida y presione con firmeza la sobre la piel. A continuación, quite el resto de la hoja. Presione con la palma de la mano el parche y cuente lentamente hasta 30.
- Es importante que toda la superficie del parche, incluido los bordes, estén en contacto con la piel. Debe cambiar el parche en los días fijados en su calendario semanal.

Cuidado de la piel


- No utilice productos para el cuidado de la piel como cremas ni pomadas en las 24 horas antes de aplicar el parche en la zona elegida
- Si la piel es sensible, el parche debe aplicarse en zonas de la piel menos sensibles, como en la parte alta del brazo o el muslo.
- Hay que dejar transcurrir al menos una semana antes de repetir la aplicación del parche en la misma zona. Si es necesario, habrá que dejar transcurrir más tiempo antes de aplicar el parche en el mismo sitio.

¿Cómo se corta el parche?

El parche es matricial, lo que significa que el medicamento está incorporado en el parche mismo. Esto permite que el parche se pueda cortar cuando se necesitan dosis más pequeñas, sin que se escape el medicamento.

El fármaco está distribuido uniformemente en el parche, por lo que al cortar es importante cuidar que los trozos sean de igual tamaño.

El parche puede cortarse en diagonal o en forma horizontal.



¿Cuánto tiempo demora en hacer efecto?

El alivio pleno del dolor se instala en forma gradual. El efecto inicial aparece entre las primeras 12 y 24 horas, que es el tiempo que tarda el medicamento en llegar desde el parche a la sangre a través de la piel.

¿Cuándo debe cambiarse el parche?

El parche es para el tratamiento a largo plazo del dolor y su efecto dura hasta cuatro días. Por lo tanto, se recomienda cambiar el parche dos veces a la semana en días fijos (por ejemplo: lunes en la mañana y jueves en la tarde).

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie

Aplicar el parche el primer día en la mañana y al cuarto día en la tarde, o viceversa, según lo señala la tabla. Por ejemplo, si se aplica inicialmente un martes en la mañana entonces deberá cambiarse el parche el viernes en la tarde y luego nuevamente el martes en la mañana, continuando siempre los mismos días.