

¿Cuándo NO debe tomar Afatinib?

- Si es alérgico a Afatinib, así como a cualquiera de los componentes del comprimido, como la lactosa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.
- En caso de tener afectada la vista por el tratamiento con Afatinib, se recomienda no conducir ni manejar maquinaria.

Conservación

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

No utilizar si observa que el envase está dañado o muestra signos de manipulación.

Vencimiento

No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Advertencias

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento solo puede conseguirse en hospitales, clínicas o farmacias especializadas.
- Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

Nota importante

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o necesita más información, contacte con su médico o farmacéutico.

Contacto

Farmacia ambulatoria



Teléfono:

225755012 (8:30 - 17:00)



Correo electrónico:

fcontreras@torax.cl



Horario:

Lunes a jueves de 8:30 a 17:00
Viernes de 8:30 a 16:00

Folleto de información al paciente

AFATINIB

20-40 MG



INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

José Manuel Infante 717, Providencia.

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO PÚBLICO

Posología

Afatinib se administra por vía oral. Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿Cómo se debe tomar el medicamento?

- Mantenga siempre el mismo horario.
- Deberá tomar la dosis indicada sin alimentos (una hora antes de comer o tres horas después) una vez al día.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua. No deben masticarse ni triturarse.
- Si tiene problemas para tragar el comprimido, disuélvalo en un vaso de agua sin gas. No se deben utilizar otros líquidos. Eche el comprimido en el agua sin triturarlo y remueva el agua durante unos 15 minutos hasta que el comprimido se haya disuelto. Beba el líquido inmediatamente. Para asegurar que se ha tomado todo el medicamento, llene el vaso nuevamente con agua y bébala.
- Evite el contacto con la piel, lávese las manos después de cada toma.

Qué hacer si...

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 8 horas, espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

Precauciones

- Adopte 2 medidas anticonceptivas y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 30.

Interacciones

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antiepilépticos: fenitoina, carbamazepina, fenobarbital.
- Hierba de San Juan, jugo de pomelo.
- Tacrolimus, Verapamilo, Amiodarona, Ciclosporina, Saquinavir, Rosuvastatina.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Falta de apetito, sangrado de nariz, náuseas, vómitos, alteraciones en las uñas.
- Diarrea de carácter leve (beba abundante agua para mantenerse bien hidratado).
- Reacciones dérmicas, como erupciones cutáneas, sobre todo, en zonas expuestas a luz solar.
- Úlceras en la boca (beba abundante agua, buena limpieza bucal).
- Lagrimeo, fotosensibilidad, visión borrosa, dolor ocular. Es posible que le realicen exámenes oculares durante el tratamiento.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre mayor que 38°C, dificultad al orinar o respirar.
- En caso de sobredosis.
- Ampollas o descamación en la piel.
- Enrojecimiento, dolor en ojos, aumento de lagrimeo, visión borrosa o sensibilidad a la luz.