

¿Cuándo NO debes tomar Alectinib?

- Si eres alérgico a Alectinib, así como a cualquiera de los componentes del comprimido, como lactosa.
- Si estás embarazada o en período de lactancia.

Conservación

Mantén los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

No los uses si observas que el envase está dañado o muestra signos de manipulación.

Vencimiento

No lo utilices después de su fecha de vencimiento indicada en el envase.

Advertencias

- Mantén los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento solo puede conseguirse en hospitales, clínicas o en farmacias especializadas.
- Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

Nota importante

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y solo pretende ser un resumen para ayudar con tu tratamiento.

Si tienes cualquier duda o necesitas más información, contáctate con tu médico o farmacéutico.

Contacto

Farmacia ambulatoria



Teléfono:

225755035



Horario:

Lunes a jueves de 8:30 a 17:00
Viernes de 8:30 a 16:00



**INSTITUTO NACIONAL
DEL TÓRAX**

**José Manuel Infante 717,
Providencia.**

Folleto de información al paciente

ALECTINIB
150MG



**INSTITUTO NACIONAL DEL
TORAX**
ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO PÚBLICO

Posología

Alectinib se administra por vía oral. Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar cada día y la frecuencia.

¿Cómo debes tomar el medicamento?

- Siempre en el mismo horario.
- 30 minutos después de la comida.
- Los comprimidos debes tragarlos enteros con un vaso de agua. No debes masticarlos, disolverlos ni triturarlos.
- Evita el contacto con la piel, lávate las manos después de cada toma.

Qué hacer si...

- **Si te has olvidado de tomar una dosis:** tómala lo antes posible. Si han transcurrido más de 6 horas, espera a la siguiente toma y no doubles nunca la dosis.
- **Si vomitas, no repitas la dosis.**

Precauciones

- Adopta 2 medidas anticonceptivas y mantenlas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento
- Consulta con tu médico antes de vacunarte.
- Es recomendable que uses gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protégete del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 30.

Interacciones

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si tomas:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, rifampicina.
- Antiretrovirales (tratamiento VIH/SIDA): ritonavir, efavirenz, nevirapina.
- Antiepilépticos: fenitoina, carbamazepina, fenobarbital
- Hierba de San Juan, jugo de pomelo.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Fatiga, sensación de debilidad o cansancio, mareos.
- Náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.
- Pérdida de apetito, alteración del gusto.
- Sensibilidad a la luz solar o erupción cutánea.
- Hinchazón causada por la acumulación de fluidos en el cuerpo.
- Aumento de peso.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.
- Signos de infección, como tos, escalofríos, fiebre mayor a 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado, como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor abdominal agudo.
- Dificultad para respirar, ansiedad, dolor en el pecho, sudor frío.