

¿Cuándo NO debe tomar Everolimus?

- Si es alérgico a Everolimus, así como a cualquiera de los componentes del comprimido, como la lactosa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

Conservación

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

No utilizar si observa que el envase está dañado o muestra signos de manipulación.

Vencimiento

No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Advertencias

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento solo puede conseguirse en hospitales, clínicas o en farmacias especializadas.
- Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

Nota importante

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o necesita más información, contacte con su médico o farmacéutico.

Contacto

Farmacia ambulatoria

**Teléfono:**

225755012 (8:30 - 17:00)

**Correo electrónico:**

fcontreras@torax.cl

**Horario:**

Lunes a jueves de 8:30 a 17:00
Viernes de 8:30 a 16:00

Folleto de información al paciente

EVEROLIMUS

10 MG



INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

José Manuel Infante 717, Providencia.

INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX
ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO PÚBLICO

Posología

Everolimus se administra por vía oral. Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿Cómo se debe tomar el medicamento?

- Mantenga siempre el mismo horario.
- Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos, una vez al día. Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua. No deben masticarse ni triturarse.
- Evite el contacto con la piel, lávese las manos después de cada toma.

Qué hacer si...

- Se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas, espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

Precauciones

- Historial de enfermedad hepática, renal, metabólica o infecciones.
- Si ha sufrido anteriormente hepatitis B, esta puede reactivarse durante el tratamiento.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 30.
- La presión arterial y la glicemia deben controlarse regularmente, ya que puede aumentar.
- El tratamiento puede influir en la cicatrización de las heridas. Si va a someterse a una intervención quirúrgica dental, siempre comuníquese a su médico.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Aumento de la temperatura, escalofríos.
- Fiebre, tos, dificultad respiratoria.

- Sed excesiva, elevada eliminación de orina, aumento del apetito.
- Disminución importante de la eliminación de orina.
- Hinchazón de las extremidades.
- Molestias estomacales incluyendo mareos, vómitos o diarrea.
- Hiperlipidemia, hiperglicemia.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre mayor a 38°C, dificultad al orinar o respirar.
- En caso de sobredosis.

Interacciones

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- IECA, antiarrítmicos, antiepilépticos, antibióticos, antifúngicos, fármacos contra VIH, hepatitis C, fármacos contra el cáncer.
- Natalizumab, Fingolimod, Leflunomida, Ciclosporina, Tacrolimus.
- Zumo de pomelo, Hierba de San Juan, Equinaceas.