

¿Cuándo NO debes tomar Erlotinib?

- Si eres alérgico a Erlotinib, así como a cualquiera de los componentes del comprimido, como lactosa.
- Si estás embarazada o en período de lactancia.
- Si padeces insuficiencia hepática.

Conservación

Mantén los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

No los uses si observas que el envase está dañado o muestra signos de manipulación.

Vencimiento

No lo utilices después de su fecha de vencimiento indicada en el envase.

Advertencias

- Mantén los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento solo puede conseguirse en hospitales, clínicas o en farmacias especializadas.
- Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

Nota importante

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y solo pretende ser un resumen para ayudar con tu tratamiento.

Si tienes cualquier duda o necesitas más información, contáctate con tu médico o farmacéutico.

Contacto

Farmacia ambulatoria



Teléfono:

225755035



Horario:

Lunes a jueves de 8:30 a 17:00
Viernes de 8:30 a 16:00



**INSTITUTO NACIONAL
DEL TÓRAX**

**José Manuel Infante 717,
Providencia.**

Folleto de información al paciente

ERLOTINIB

150MG



**INSTITUTO NACIONAL DEL
TORAX**
ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO PÚBLICO

Posología

Erlotinib se administra por vía oral. Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar cada día y la frecuencia.

¿Cómo debes tomar el medicamento?

- Siempre en el mismo horario.
- No consumir ningún alimento por lo menos 2 horas antes y 1 hora después de tomarlo.
- Toma el medicamento SOLO con 1 vaso agua.
- Debes tragarte los comprimidos enteros. Si tienes problemas para tragarlo puedes disolverlo en un poco de agua y tomarlo inmediatamente.
- Evita el contacto con la piel, lávate las manos después de cada toma.

Qué hacer si...

- **Te has olvidado de tomar una dosis:** tómala lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas, espera a la siguiente toma y no doubles nunca la dosis.
- **Si vomitas,** únicamente repite la dosis si han transcurrido menos de 30 minutos desde la toma.

Precauciones

- Adopta 2 medidas anticonceptivas y mantenlas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulta a tu médico antes de vacunarte.
- Es recomendable que uses gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protégete del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 30.
- Si tomas inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) o antagonistas-H2 (ranitidina), hazlo 4 horas antes o 2 horas después de Erlotinib.

Interacciones

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si consumes:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, rifampicina.
- Antiretrovirales (tratamiento VIH/SIDA): ritonavir, efavirenz, nevirapina.
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- Hierba de san Juan, jugo de pomelo.
- Quimioterapias: paclitaxel, pemetrexed, gefitinib, lapatinib.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal.
- Fatiga, cansancio.
- Pérdida de peso.
- Disminución del apetito y alteración del gusto.
- Dolor, enrojecimiento o llagas en la boca.
- Enrojecimiento y sequedad de la piel, picor.
- Dificultad para respirar, tos.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.
- Signos de infección, como tos, escalofríos, fiebre mayor a 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado, como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Ojos o piel amarillentos.
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.
- Dificultad para respirar.
- En caso de sobredosis.