

¿Cuándo NO debes tomar Gefitinib?

- Si eres alérgico a Gefitinib, así como a cualquiera de los componentes del comprimido, como lactosa.
- Si estás embarazada o en período de lactancia.

Conservación

Mantén los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

No los uses si observas que el envase está dañado o muestra signos de manipulación.

Vencimiento

No lo utilices después de su fecha de vencimiento indicada en el envase.

Advertencias

- Mantén los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento solo puede conseguirse en hospitales, clínicas o en farmacias especializadas.
- Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

Nota importante

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y solo pretende ser un resumen para ayudar con tu tratamiento.

Si tienes cualquier duda o necesitas más información, contáctate con tu médico o farmacéutico.

Contacto

Farmacia ambulatoria



Teléfono:

225755035



Horario:

Lunes a jueves de 8:30 a 17:00
Viernes de 8:30 a 16:00



**INSTITUTO NACIONAL
DEL TÓRAX**

**José Manuel Infante 717,
Providencia.**

Folleto de información al paciente

GEFITINIB
250MG



**INSTITUTO NACIONAL DEL
TORAX**
ATENCIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO PÚBLICO

Posología

Gefitinib se administra por vía oral. Tu médico te indicará la cantidad de medicamento que debes tomar cada día y la frecuencia.

¿Cómo debes tomar el medicamento?

- Siempre en el mismo horario.
- Puedes tomarlo con o sin comida.
- Debes tragarte los comprimidos enteros. Si tienes problemas para tragarlo, puedes disolverlo en un poco de agua y tomarlo inmediatamente.
- Si tienes problemas para tragar el comprimido, disuélvelo en medio vaso de agua (sin gas). No lo tritures. Remuévelo hasta que el comprimido se haya disuelto (puede tardar hasta 20 minutos). Bebe inmediatamente. Para asegurar que te has bebido todo el medicamento, enjuaga bien el vaso con medio vaso de agua y bébetelo.
- Evita el contacto con la piel, lávete las manos después de cada toma.

Qué hacer si...

- **Te has olvidado de tomar una dosis:** tómala lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas, espera a la siguiente toma y no doubles nunca la dosis.
- **Si vomitas,** únicamente repite la dosis si han transcurrido menos de 30 minutos desde la toma.

Precauciones

- No tomes antiácidos 4 horas antes o 2 horas después de tomar Gefitinib.
- Adopta 2 medidas anticonceptivas y mantenlas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulta a tu médico antes de vacunarte.
- Es recomendable que uses gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protégete del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 30.

Interacciones

Pregunta a tu médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si tomas:

- Antiácidos o inhibidores de la bomba de protones. Puede afectar la absorción, distanciar 2 horas de Gefitinib.
- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, rifampicina.
- Antiretrovirales (tratamiento VIH/SIDA): ritonavir, efavirenz, nevirapina.
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- Hierba de San Juan, jugo de pomelo.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea, náuseas, vómitos.
- Enrojecimiento, picor o sequedad de piel, acné, alteraciones de las uñas.
- Sequedad de boca, llagas en la boca.
- Sequedad ocular, conjuntivitis.
- Fatiga, cansancio.
- Disminución del apetito.
- Pérdida de peso.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debes tomar medidas higiénicas.

Avisa rápidamente a tu médico si tienes:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre mayor a 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado, como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Ojos o piel amarillentos.
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.
- Dificultad para respirar.
- En caso de sobredosis.